

Crapaud commun

Bufo bufo


Ce crapaud est le plus commun dans la Drôme. On le reconnaît facilement à ses pupilles horizontales entourées d'un **iris rouge cuivré**.

On le retrouve de la **plaine** à la **montagne** du moment qu'un point d'eau est présent dans les environs. Son activité est crépusculaire et nocturne, mais peut être diurne en période orageuse.

Cette espèce **hiberne** de novembre à février sous un **tas de feuilles**, dans des **souches** ou dans un **terrier** de rongeur.



Intensité d'activité



Services sur ma parcelle

Cet amphibien se nourrit principalement de **Coléoptères** et de **fourmis**. Le crapaud commun est **prédaté par des Mustélinés**, qui sont d'importants auxiliaires de cultures. Favoriser la présence de l'un augmentera la population de l'autre, qui limitera la propagation d'autres espèces ravageuses tels les **campagnols**, **mulots** et **taupes**.

Comment l'inviter chez moi ?

Le crapaud commun est une espèce **migratrice**. Ce terme est à prendre à la légère puisque la migration est rarement supérieure à **1 kilomètre**. Ils se déplacent dès la sortie d'hibernation en Février pour chercher un partenaire sexuel. La reproduction se fait dans l'eau, et la femelle produit entre **5 000** et **7 000 oeufs**.



Ayant besoin d'un **milieu aqueux** pour pondre ses oeufs, il est important de creuser une **mare** si on souhaite valoriser ce crapaud sur ses parcelles. Cette espèce a une préférence pour les **mares temporaires** mais utilisera aussi une mare permanente.



Les **bandes enherbées** permettent au crapaud de se déplacer dans un environnement humide et à l'abri des oiseaux prédateurs.



Il est possible de déposer quelques **tas de bois mort** de tailles différentes afin d'offrir un **refuge d'hibernation** pour le crapaud. Evitez de piétiner ou d'enlever les **feuilles mortes** au sol sous les arbres ou en lisière de forêt pour ne pas les déranger.